

บทที่ 9

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

ประสิทธิภาพในการผลิตไข่ฟักของพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงหรือพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่นั้นจะขึ้นอยู่กับทักษะการเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ ถ้าผู้เลี้ยงมีการเลี้ยงและการจัดการที่ถูกต้องจะทำให้ผู้ไก่พ่อแม่พันธุ์มีเปอร์เซ็นต์การไข่สูง มีอัตราการผสมติดสูง มีอัตราการฟักออกสูง และลูกไก่ที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีอีกด้วย ในทางกลับกัน ถ้าหากผู้เลี้ยงดูแลและจัดการไม่ได้ก็จะทำให้สมรรถภาพด้านต่าง ๆ ด้อยลงและลูกไก่ที่ฟักออกมาก็จะมีคุณภาพต่ำตามไปด้วย

พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (Layer breeder) เป็นไก่ที่ได้รับการคัดเลือกและมีการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีสมรรถนะการให้ผลผลิตไข่เป็นหลักทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่ในปัจจุบันสามารถแบ่งไก่ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ไก่ไข่ที่ให้ไข่เปลือกสีขาวและไก่ไข่ที่ให้ไข่เปลือกสีน้ำตาลหรือเรียกว่า ไก่สีน้ำตาลตามสีของไข่ปกคลุมลำตัว

พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง (Broiler breeder) เป็นไก่ที่ได้รับการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์มาเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว อายุการเลี้ยงสั้น ให้น้ำมาก แต่จะมีผลทำให้ผลผลิตไข่ต่ำ พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ออกมาเป็น สายพันธุ์มาตรฐาน (Standard type) และสายพันธุ์ขนาดเล็ก (Mini-type หรือ dwarf-type breeder) ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตสายพันธุ์ไก่กระทงนิยมใช้ไก่แม่พันธุ์สายพันธุ์ขนาดเล็กผสมพันธุ์กับไก่พ่อพันธุ์สายพันธุ์มาตรฐานเพื่อผลิตเป็นลูกไก่กระทง

สัดส่วนไก่พ่อแม่พันธุ์

ไก่พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงจะได้รับมาจากฟาร์มที่เลี้ยงเป็นปุ๋ย่าพันธุ์ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงพันธุ์แยกกันเพื่อผลิตเป็นสายพ่อพันธุ์ หรือสายแม่พันธุ์โดยเฉพาะ จำนวนไก่สายพ่อพันธุ์และสายแม่พันธุ์ที่จะสั่งเขามาเลี้ยงนั้นจะต้องคำนึงถึงสัดส่วนของเพศและอัตราการเลี้ยงต่อพื้นที่ด้วย สัดส่วนที่นิยมใช้สำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงจะใช้อัตราส่วนไก่พ่อพันธุ์จำนวน 12-15 ตัว/ไก่แม่พันธุ์ 100 ตัว ส่วนไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จะใช้อัตราส่วนไก่พ่อพันธุ์จำนวน 10-12 ตัว/ไก่แม่พันธุ์ 100 ตัว

การตัดนิ้วเท้า (Toe trimming หรือ Toe clipping)

ไก่พ่อพันธุ์มักจะนิยมตัดนิ้วเท้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือการเกิดบาดแผลบริเวณหลังไก่ตัวเมีย เนื่องจากเมื่อถึงเวลาจะผสมพันธุ์ ไก่ตัวผู้จะขึ้นไปยืนบนหลังไก่ตัวเมียถ้ามีเล็บยาวจะทำให้เล็บขีดข่วนบนหลังตัวเมียได้ การป้องกันจึงจำเป็นจะต้องมีการตัดเล็บหรือตัดนิ้วเท้าบริเวณกระดูกปลายนิ้วข้อสุดท้ายของนิ้วหลังเมื่อไก่อายุ 1 วัน ถ้าหากไก่สายพันธุ์ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บบริเวณหลังตัวเมีย

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

มากก็อาจจะมีการตัดนิ่วเท้าเพิ่มเติมโดยจะตัดปลายนิ่วข้อสุดท้ายของนิ่วหน้าด้านในอีกข้างละ 2 นิ้ว ก็ได้ ไก่ตัวผู้บางสายพันธุ์ก็อาจจำเป็นจะต้องตัดหรือจี๊ดอย่างด้วยโลหะร้อนอีกด้วย การตัดนิ่วเท้าจะทำได้โดยการใช้ใบมีดร้อนตัดเช่นเดียวกับการตัดปากไก่

การตัดหงอน (Comb trimming หรือ Dubbing)

ไก่ตัวผู้มักจะมีหงอนใหญ่และมีเหนียงยื่นมาอย่างยาวอ่อนมาก เมื่อไก่ตัวผู้โตขึ้นทั้งหงอนและเหนียง จะมีขนาดใหญ่มาก บางครั้งอาจจะงองพับลงมา หงอนไก่ที่มีขนาดใหญ่นี้จะเป็นเป้าหมายในการต่อสู้เพื่อแย่งตัวเมียและเพื่อจัดลำดับทางสังคม จนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย นอกจากนี้ หงอนและเหนียงขนาดใหญ่ของไก่ตัวผู้จะเป็นอุปสรรคในการดื่มน้ำและกินอาหารอีกด้วย การตัดหงอนจะกระทำด้วยเครื่องตัดปากไก่หรือใช้กรรไกรสำหรับตัดหงอนโดยเฉพาะโดยจะทำการตัดเมื่อไก่อายุ 1 วันพร้อมกับการตัดนิ่วเท้า ข้อดีของการตัดหงอนอีกประการหนึ่งคือ สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการแยกเพศได้หรือไม่

ไก่ผิดเพศ (Sexing error)

เนื่องจากไก่พ่อแม่และแม่พันธุ์จะมาจากสายการปรับปรุงพันธุ์ที่แตกต่างกัน ไก่ที่ผลิตมาเพื่อเป็นพ่อพันธุ์จะมีการตัดนิ่วเท้า ตัดหงอน และจี๊ดอย่าง เรายังสามารถใช้ลักษณะนี้ตรวจสอบความถูกต้องของเพศได้ โดยถ้าหากเราพบว่ามีไก่ตัวเมียตัวใดถูกตัดนิ่วเท้า ตัดหงอน และจี๊ดอย่าง ก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นมาจากไก่สายพ่อพันธุ์ ในทางกลับกันถ้าหากเราพบไก่ตัวผู้ตัวใดยังมีนิ่วเท้าและหงอนอยู่ครบถ้วนแสดงว่าไก่ตัวนั้นมากจากสายไก่สายพันธุ์ตัวเมีย ซึ่งจำเป็นจะต้องคัดออกทันที มิฉะนั้นถ้าปล่อยไว้ในฝูงอาจจะทำให้ได้ลูกไก่ในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ได้

การเลี้ยงไก่ในระยะเริ่บต้น (0-20 สัปดาห์)

โรงเรือน ไก่พ่อแม่พันธุ์ที่ดีจะต้องปราศจากโรคติดต่อ ดังนั้นโรงเรือนเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์จึงจำเป็นต้องมีระบบป้องกันภัยทางชีวภาพ (Bio-security) จะต้องปราศจากเชื้อโรคบางอย่างที่สามารถติดต่อได้ทางพันธุกรรมและทางไข้ฟัก เช่น ซัลโมเนลล่า (*Salmonella*) โรคชี้ขาว (*Pullorum*) โรคไก่ฟอยด์สัตว์ปีก (*Fowl typhoid*) นิวคาสเซิล (*Newcastle*) โรคหวัดเรือรัง (*Mycoplasma gallicpticum*) *Mycoplasma synoviae* ฯลฯ ปัจจุบันบางพาร์มอนอกจากจะมีการป้องกันเชื้อต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีโปรแกรมการป้องกันเชื้อ *Salmonella enteritidis* และ *Salmonella typhimurium*

โรงเรือนเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์จะต้องป้องกันโรคจากภายนอกเข้ามายังไก่ มีการแยกผู้ไก่เลี้ยงตามอายุ ตามวัตถุประสงค์ เช่น เลี้ยงเพื่อเป็นปูย่าพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ หรือเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อหรือไข่

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

นอกจากจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดถึงกันแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดเนื่องจากการทำวัคซีนไม่พร้อมกันอีกด้วย

ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์จะต้องไม่อยู่ใกล้กับฟาร์มที่เลี้ยงไก่เพื่อเอาเนื้อหรือไข่เพื่อการค้า ผู้เลี้ยงเองก็จะต้องแยกกันระหว่างไก่แต่ละฝูงหรือโรงเรือนแต่ละหลัง ผู้เลี้ยงจะต้องมีการอาบน้ำยาฆ่าเชื้อและสวมชุดทำงานที่ปราศจากเชื้อโรคติดต่อ

ระบบการเลี้ยงไก่รุ่น

การเลี้ยงไก่เล็ก-รุ่น (Brood-grow system)

การเลี้ยงไก่รุ่นรูปแบบนี้ ไก่จะอยู่ในโรงเรือนเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนการทั่งถึงไก่รุ่นก่อนไข่ หรือจนกระทั่งขับไข่ไปยังโรงเรือนไข่ การเลี้ยงแบบนี้นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

ในระยะแรกจะใช้พื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของโรงเรือนสำหรับกลูกไก่จนกระทั่งอายุได้ประมาณ 5 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงปล่อยให้ไก่กระจายจนเต็มพื้นที่ทั้งโรงเรือนและเลี้ยงต่อไปจนกระทั่งอายุได้ประมาณ 18 สัปดาห์ สำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ และประมาณ 20 สัปดาห์สำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง หลังจากนั้นไก่รุ่นก็จะถูกขับไข่ไปยังโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ต่อไป การเลี้ยงไก่เล็ก-รุ่นระบบนี้จะประหยัดต้นทุนค่าโรงเรือนแต่ไก่จะเกิดความเครียดเนื่องจากการขันส่งจนอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และการให้ไข่ได้ในช่วงแรกได้

การเลี้ยงไก่เล็ก-รุ่น-ไข่ (Brood-grow-lay system)

การเลี้ยงไก่รูปแบบนี้ลูกไก่จะอยู่ภายใต้โรงเรือนเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนไข่ไปจนกระทั่งปลดไข่ ตั้งนั้นโรงเรือนที่เลี้ยงไก่แบบนี้จะต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนสำหรับไก่แต่ละช่วงอายุและจะต้องออกแบบมาให้เหมาะสมสมสำหรับการเลี้ยงไก่แต่ละช่วงอายุอีกด้วย จำนวนลูกไก่ที่จะส่งเข้ามาเลี้ยงในระยะแรกจะต้องเท่ากับจำนวนความจุของโรงเรือนเลี้ยงไก่ในระยะให้ไข่ การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ระบบนี้ มีข้อดีคือ จะไม่ก่อให้เกิดความเครียดเนื่องจากการขันย้ายไก่และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขันย้ายไก่ได้ แต่ระบบนี้มีข้อเสียคือ ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงเรือนจะสูงกว่าเนื่องจากจะต้องมีอุปกรณ์ก่อสร้างใหม่ให้น้ำ ให้อาหารสำหรับไก่เล็กภายในโรงเรือนด้วย ซึ่งจะใช้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ทำให้การใช้อุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพจึงทำให้การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์รูปแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

โรงเรือนควบคุมแสง (Black-out growing)

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์จะต้องเลี้ยงภายใต้โรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สำหรับไก่ได้ทั้งการระบายอากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมแสงสว่างซึ่งจะ

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ของไก่ การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ในปัจจุบันจะนิยมใช้โรงเรือนระบบปิดที่สามารถควบคุมแสงสว่างได้ทั้งความยาวแสงและความเข้มแสงหรือ เรียกว่าโรงเรือนระบบ “Black-out” แสงสว่างที่ໄก่ได้รับจะมาจากหลอดไฟฟ้าที่ติดไว้ให้เท่านั้น ผนังด้านข้างของโรงเรือนจะมีผ้าม่านสีดำป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์เข้ามาในช่วงกลางวัน

ข้อดีของโรงเรือนระบบ Black-out ได้แก่

- สามารถควบคุมอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกได้
- สามารถยืดอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกได้ ทำให้ได้ไข่ฟักที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
- ความสม่ำเสมอของน้ำหนักตัวไก่ในผุ่งจะดีขึ้น
- สามารถลดน้ำหนักตัวไก่ลงได้โดยที่ผลผลิตไม่ลดลง
- การกินอาหารของไก่ลดลง
- เนื่องจากสามารถควบคุมให้มีความยาวแสงสั้นลงและความเข้มแสงน้อยลงจึงทำให้นิสัยการจิกตีกันและนิสัยก้าวร้าวลดลงได้

การให้แสงสว่างสำหรับลูกไก่ในช่วง 1 สัปดาห์แรกมักจะให้แสงตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ໄก่ได้มีโอกาสกินน้ำและอาหารอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกไก่มีน้ำหนักตัวได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นก็จะมีการควบคุมแสงสว่างซึ่งโดยทั่วไปแล้วโปรแกรมการให้แสงสว่างสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงและพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จะแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 โปรแกรมการให้แสงสว่างที่แนะนำสำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง

| อายุ (วัน) | ความยาวแสง (ชั่วโมง/วัน) | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------------------|--|
| 1-5 | 23 | ความเข้มแสง 3.5 พุตเทียน/ให้กินอาหารอย่างเต็มที่ |
| 6-132 | 8 | ความเข้มแสง 1 พุตเทียน/ควบคุมอาหาร |
| 133-146 | 10 | ย้ายไปยังโรงเรือนผสมพันธุ์ (โรงเรือนໄก่ไข่) |
| 147-160 | 12 | |
| 161-167 | 14 | ให้ไข่ฟองแรก/ให้อาหารไก่พ่อแม่พันธุ์ |
| 168-174 | 14 | ให้ผลผลิตไข่ประมาณ 5% ของผุ่ง |
| 175-188 | 15 | เริ่มน้ำไข่เข้าฟัก |
| 189-สิ้นสุด | 16 | ให้ผลผลิตไข่ประมาณ 50% ของผุ่ง |

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 627

ตารางที่ 2 โปรแกรมการให้แสงสว่างที่แนะนำสำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่พันธุ์เล็กช่วงขา

| อายุ (วัน) | ความยาวแสง (ชั่วโมง/วัน) | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1-7 | 23 | |
| 8-14 | 19 | |
| 15-21 | 16 | |
| 22-28 | 14 | |
| 29-35 | 12 | |
| 36-41 | 10 | |
| 43-140 | 9 | |
| (134-140) | | เริ่มให้อาหารไกระยะให้ไว |
| 141-147 | 10 | เริ่มให้ไวเพองแรก |
| 148-154 | 11 | ให้ผลผลิตไจ่ประมาณ 5% |
| 155-161 | 12 | |
| 162-168 | 13 | เริ่มน้ำไวเข้าฟัก |
| 169-175 | 14 | |
| 176-182 | 15 | |
| 183-สิ้นสุด | 16 | |

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 628

รูปแบบของพื้น

โรงเรือนเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ในระยะไกรุ่นนิยมใช้พื้นโรงเรือน 2 ลักษณะคือ

- พื้นที่ปูทับด้วยวัสดุรองพื้นทั้งหมด (All-litter floor)

- พื้นกึ่งสล๊อต (Combination of slat and litter floor หรือ Partial slat) เป็นพื้นที่มีส่วนหนึ่งของโรงเรือนปูทับด้วยวัสดุรองพื้นและมีส่วนหนึ่งที่ยกสูงแล้วติดตั้งสล๊อตซึ่งอาจจะทำด้วยตาข่ายพลาสติก หรือไม้ก็ได้

ระบบการเลี้ยงไก่เล็ก-รุ่น

การเลี้ยงแบบแยกเพศ (Sex separation)

ในระยะไกลีกนั้นควรจะเลี้ยงแยกกันระหว่างไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมีย อย่างน้อยที่สุดก็ในช่วงสัปดาห์แรก เนื่องจากในช่วงแรกไก่ตัวผู้มักจะอ่อนแอกว่าไก่ตัวเพราะจะต้องผ่านการตัดหงอน การตัด

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

นี้ว่าเท่า และการจี้เดือยมาก่อน โปรแกรมการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์แบบแยกเพศมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ แต่ ลักษณะจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะของโรงเรือน สภาพภูมิอากาศ ประเภทของ อุปกรณ์ที่มีอยู่ ความสะดวกในการจัดการของผู้เลี้ยง และสายพันธุ์ไก่

การเลี้ยงแบบแยกเพศในช่วง 4-6 สัปดาห์แรก

การเลี้ยงรูปแบบนี้ไก่ตัวผู้และตัวเมียจะถูกเลี้ยงไว้ภายใต้同一屋檐下 แต่จะใช้ตาข่ายกัน แบ่งเอาไว้คนละกอก การเลี้ยงแบบนี้จะต้องเลี้ยงจนกระทั่งไก่ตัวผู้แข็งแรงและเจริญเติบโตเพียงพอ เสียก่อนจึงจะนำมาเลี้ยงรวมกับไก่ตัวเมีย การเลี้ยงไก่รูปแบบนี้จะสามารถช่วยลดพัฒนาระบบจิกตีกัน และลดการจัดลำดับทางสังคมได้

การเลี้ยงแยกเพศจนกระทั่งอายุ 10 สัปดาห์

การเลี้ยงรูปแบบนี้จะใช้แรงงานมากเนื่องจากจะต้องแบ่งแยกไก่ให้อยู่กันคนละห้อง โดยปกติไก่ มักจะมีการจัดลำดับทางสังคมเมื่ออายุประมาณ 8 สัปดาห์ ดังนั้น การนำไก่ตัวผู้เข้ามาเลี้ยงรวมกับไก่ตัว เมียเมื่ออายุ 10 สัปดาห์จะทำให้เกิดปัญหาการจิกตีกันมากกว่าระบบแรก

การเลี้ยงแยกเพศจนกระทั่งเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

การเลี้ยงรูปแบบนี้ต้องการห้องขนาดใหญ่หรืออาจจะเลี้ยงแยกกันอยู่คนละโรงเรือน การเลี้ยง แบบนี้สามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ตัวผู้ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ ดีขึ้นและสามารถลดปัญหาไก่ตัวผู้ถึงวัยเจริญพันธุ์ก่อนตัวเมียอีกด้วย แต่เมื่อนำไก่ทั้งสองเพศมาร่วมกัน จะมีการจัดลำดับทางสังคมเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้มีอัตราการตายสูงมาก การเลี้ยงแบบนี้ อาจจะทำให้ไก่ตัวผู้และตัวเมียมีภัยคุกคามโรคที่แตกต่างกันได้

การควบคุมน้ำหนักตัวในระยะไกร่รุ่น

เป้าหมายหลักในการจัดการไกรุ่นนั้นก็คือ การควบคุมน้ำหนักตัวให้ได้ตามมาตรฐานของแต่ละ สายพันธุ์ตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการควบคุมทั้ง น้ำหนักตัวและความสม่ำเสมอของน้ำหนักตัว เนื่องจากจะมีผลต่อสมรรถภาพการผสมพันธุ์และการฟัก ออกรของไข่ฟักเป็นอย่างมาก

ความสำคัญของน้ำหนักตัว

พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงจะมีการคัดเลือกให้มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้เนื้อมาก ซึ่งถ้าหากพ่อแม่พันธุ์ ได้กินอาหารแบบเต็มที่เป็นเวลา 6 สัปดาห์จะสามารถเพิ่มน้ำหนักตัวให้ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการในไกร่ พ่อแม่พันธุ์ที่อายุ 20 สัปดาห์ได้ ส่งผลให้ไก่มีน้ำหนักตัวเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์มากเกินไป ดังนั้นการควบคุม

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

น้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไปนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม น้ำหนักตัวที่เหมาะสมของไก่แต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันขึ้นกับสายพันธุ์ บริษัทผู้ผลิต ถูกากล สภาพการจัดการ และคุณภาพอาหาร ฯลฯ

อัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวของไก่นั้นควรจะมีการควบคุมตั้งแต่อายุ 3 สัปดาห์จนกระทั่งปิดไข่ เพื่อให้ได้ผลผลิตไข่สูงที่สุดและมีอัตราการผสมติดสูงที่สุด

การควบคุมน้ำหนักตัวของไก่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อให้มีโครงสร้างที่สมบูรณ์ และไม่มีไขมันสะสมมากเกินไปจะมีข้อดีดังต่อไปนี้

- มีความสม่ำเสมอของน้ำหนักตัวในฝูงดี
- ไก่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และเริ่มให้ไข่ฟองแรกช้าลง
- ฟองไข่มีขนาดใหญ่ขึ้น
- การให้ผลผลิตไข่เพิ่มมากขึ้น
- ปริมาณไข่ที่สามารถนำเข้าฟักได้เพิ่มมากขึ้น
- อัตราการตายระหว่างการไข่ลดลง
- ต้นทุนค่าอาหารในช่วงไก่รุ่นลดลง
- ต้นทุนไข่ฟักลดลง
- อัตราการผสมติดเพิ่มขึ้น (เบอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อเพิ่มขึ้น)
- อัตราการฟักออกเพิ่มขึ้น

น้ำหนักตัวที่แนะนำสำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทะ

ไก่สายพันธุ์ที่แตกต่างกันจะมีน้ำหนักตัวมาตรฐานหรือน้ำหนักพิกัด (Target weight) ที่แนะนำ แตกต่างกันขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตสายพันธุ์ไก่ ดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อมีการนำไก่แม่พันธุ์ขนาดเล็ก (Mini meat-type) ผสมกับพ่อพันธุ์มาตรฐานเพื่อผลิตเป็นลูกไก่กระทะนั้น ควรจะมีการควบคุมน้ำหนักตัวไก่ตัวผู้ให้มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ตัวผู้มีน้ำหนักมากเกินไปหรือป้องกันไม่ให้ไก่ตัวเมียต้องแบบภาระน้ำหนักตัวผู้มากเกินไปขณะผสมพันธุ์ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการผสมพันธุ์ได้

ตารางที่ 3 น้ำหนักมาตรฐานหรือน้ำหนักพิกัด (Target weight) สำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทะย่างไกรุน (กรัม/ตัว)

| อายุ (สัปดาห์) | แม่พันธุ์ขนาดเล็ก | แม่พันธุ์มาตรฐาน | พ่อพันธุ์ |
|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1 | 120 | 130 | 140 |
| 2 | 220 | 240 | 300 |
| 3 | 320 | 350 | 450 |
| 4 | 420 | 460 | 600 |
| 5 | 520 | 570 | 750 |
| 6 | 620 | 670 | 900 |
| 7 | 710 | 770 | 1,050 |
| 8 | 790 | 880 | 1,200 |
| 9 | 870 | 990 | 1,350 |
| 10 | 950 | 1,100 | 1,500 |
| 11 | 1,030 | 1,210 | 1,650 |
| 12 | 1,110 | 1,320 | 1,800 |
| 13 | 1,190 | 1,430 | 1,950 |
| 14 | 1,270 | 1,540 | 2,100 |
| 15 | 1,350 | 1,650 | 2,250 |
| 16 | 1,430 | 1,760 | 2,400 |
| 17 | 1,510 | 1,870 | 2,550 |
| 18 | 1,590 | 1,980 | 2,700 |
| 19 | 1,670 | 2,090 | 2,850 |
| 20 | 1,750 | 2,200 | 3,000 |

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 632

การจำกัดอาหารสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทะ

การควบคุมน้ำหนักตัวไกรุนให้ได้ตามมาตรฐานของแต่ละสายพันธุ์นั้นจะทำได้โดยการควบคุมปริมาณอาหารที่กิน การควบคุมอาหารมีอยู่หลายวิธี ดังนี้

1. การจำกัดอาหาร (Feed restriction) เป็นการจำกัดปริมาณอาหารที่ให้กินในแต่ละวัน ตามปริมาณที่กำหนดโดยผู้เลี้ยง

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

2. การให้อาหารแบบข้ามวัน (Skip day feeding)
3. การให้อาหารแบบวันเว้นวัน (Skip a day feeding)
4. ให้อาหาร 2 วันเว้น 1 วัน (Feed 2 day and skip a day)
5. การให้อาหาร 5 วัน เว้น 2 วัน ใน 1 สัปดาห์ (Feed 5 day and skip 2 day)

การจำกัดปริมาณน้ำดื่ม

เมื่อมีการจำกัดปริมาณอาหารที่กินจะส่งผลให้ไก่ดื่มน้ำมากขึ้น ส่งผลให้ไก่ถ่ายมูลเหลวและมีน้ำท咯ลงพื้นมากขึ้นเนื่องจากการแก่และกินน้ำส่งให้ไก่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการก้าชแอนโนเมเนีย ดังนั้น เมื่อมีการจำกัดอาหารควรจะมีการจัดการน้ำดื่มด้วยดังนี้

- ในวันที่ให้อาหาร จะให้ไก่ได้ดื่มน้ำก่อนถึงเวลาให้อาหารประมาณ 30 นาที หลังจากที่ไก่กินอาหารหมดแล้วประมาณ 1 ชั่วโมงจึงดูดการให้น้ำ แล้วจะให้น้ำอีกรั้งในช่วงบ่าย

- ในวันที่ไม่ให้อาหาร ถ้าหากอุณหภูมิโรงเรือนต่ำกว่า 21°C ควรให้ไก่ได้ดื่มน้ำในช่วงเช้าประมาณ 1 ชั่วโมง และให้น้ำดื่มอีกรั้งในช่วงบ่าย ถ้าหากอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า 21°C ควรให้ไก่ได้ดื่มน้ำในช่วงเช้าประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และให้อีกรั้งในช่วงบ่ายและช่วงค่ำก่อนการปิดแสงสว่าง

- ไม่ควรจำกัดปริมาณน้ำดื่มถ้าหากอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า 27°C หรือถ้าหากไก่เกิดความเครียดเนื่องจากความร้อน

ระยะเวลาที่ใช้ในการดื่มน้ำจะขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของอุปกรณ์ให้น้ำ อัตราส่วนของไก่ต่ออุปกรณ์ให้น้ำ ความหนาแน่นของไก่ต่อพื้นที่ และรูปแบบของอาหาร ฯลฯ โดยปกติไก่จะใช้เวลาในการดื่มน้ำจากนิปเปิลมากกว่าถังน้ำอัตโนมัติ (Bell shape drinker) หรือแบบรางอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไก่ดื่มได้อย่างถูกต้องจึงควรจะมีการติดตั้งมาตรฐานกว่า ค่าน้ำหนักตัวที่แนะนำสำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่

ไก่ไข่มีได้คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อให้มีการเจริญเติบโตเร็ว ดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับไก่มีน้ำหนักตัวมากกว่าน้ำหนักมาตรฐานที่แนะนำนั้นจึงไม่ค่อยปรากฏเหมือนกับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงอย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มต่ำกว่ามาตรฐานมากกว่า ค่าน้ำหนักตัวที่แนะนำโดยบริษัทผู้ผลิตสายพันธุ์ไก่เล็กอยู่พอสมควรและไก่ไข่สินั้นต้องดัดแปลงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงน้ำหนักตัวมาตรฐานหรือน้ำหนักตัวพิกัดสำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่พันธุ์เล็กชอร์นและไก่ไข่สีน้ำตาล (กรัม)

| อายุ (สัปดาห์) | ไก่พันธุ์เล็กชอร์นขาว | | ไก่ไข่สีน้ำตาล | |
|----------------|-----------------------|--------|----------------|--------|
| | ตัวเมีย | ตัวผู้ | ตัวเมีย | ตัวผู้ |
| 1 | 90 | 140 | 130 | 180 |
| 2 | 140 | 180 | 180 | 220 |
| 3 | 210 | 260 | 260 | 320 |
| 4 | 280 | 360 | 340 | 450 |
| 5 | 350 | 450 | 420 | 580 |
| 6 | 420 | 550 | 500 | 720 |
| 7 | 500 | 640 | 580 | 860 |
| 8 | 580 | 770 | 660 | 990 |
| 9 | 660 | 860 | 740 | 1,100 |
| 10 | 740 | 1,000 | 820 | 1,190 |
| 11 | 820 | 1,090 | 900 | 1,320 |
| 12 | 900 | 1,130 | 980 | 1,420 |
| 13 | 980 | 1,230 | 1,060 | 1,550 |
| 14 | 1,050 | 1,320 | 1,140 | 1,640 |
| 15 | 1,100 | 1,410 | 1,220 | 1,730 |
| 16 | 1,150 | 1,450 | 1,300 | 1,820 |
| 17 | 1,200 | 1,520 | 1,380 | 1,910 |
| 18 | 1,250 | 1,560 | 1,460 | 1,980 |
| 19 | 1,300 | 1,610 | 1,540 | 2,010 |
| 20 | 1,350 | 1,690 | 1,620 | 2,130 |

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 635

การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ระยะให้ไข่

ความต้องการพื้นที่การเลี้ยง (Floor space) ไก่แม่พันธุ์ต้องการพื้นที่การเลี้ยงมากกว่าไก่ไข่ที่เลี้ยงเพื่อให้ผลผลิตไข่เพียงอย่างเดียว ความต้องการพื้นที่การเลี้ยงมักจะบ่งบอกเป็นค่าความหนาแน่นมีหน่วยเป็น พื้นที่/ตัว

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

ชนิดของพื้น (Floor type) โรงเรือนที่เป็นพื้นสแลททั้งหมด (All slats) ปัจจุบันไม่นิยมใช้กันในการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ แต่โรงเรือนที่เป็นพื้นปูทับด้วยวัสดุรองพื้นทั้งหมด (All litter) ยังนิยมใช้กันอยู่ การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้พื้นแบบกึ่งสแลท คือ ภายในโรงเรือนจะมีพื้นที่ปูทับด้วยวัสดุรองพื้นบางส่วนร่วมกับพื้นที่ยกสูงเป็นสแลทบางส่วน สัดส่วนการใช้พื้นสแลทมีตั้งแต่ 10-70% ของพื้นที่ในโรงเรือนที่ใช้พื้นแบบกึ่งสแลทจะมีการวางแผนอุปกรณ์ให้น้ำและรังไข่อยู่บนส่วนที่เป็นพื้นสแลท

ข้อดีของพื้นแบบกึ่งสแลทคือ วัสดุรองพื้นจะเสื่อมสภาพช้าลงถึงแม้ว่าจะเลี้ยงไก่ภายใต้ความหนาแน่นสูงก็ตาม เนื่องจากมูลที่ไก่ขับถ่ายออกมากางส่วนจะอยู่ภายใต้พื้นสแลท

พื้นสแลทที่ทำจากลวดไม่แนะนำให้ใช้ในไก่พ่อแม่พันธุ์因为จะทำให้เกิดบาดแผลที่ห้าได้ง่าย และไก่มักจะหลีกเลี่ยงที่จะผสมพันธุ์บนพื้นตาข่ายจึงทำให้อัตราการผสมติดลดลง ดังนั้น พื้นสแลทที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์因为จะทำให้อัตราการผสมติดลดลง ดังนั้น พื้นสแลทที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์because it is easier to clean and maintain than solid floor systems.

พื้นที่ปูทับด้วยวัสดุรองพื้นทั้งหมด (All slats)

ถ้าหากมีการจัดการวัสดุรองพื้นอย่างดี วัสดุรองพื้นนั้นแห้ง ไม่เปียกชื้น ไม่จับตัวกันเป็นก้อนแข็ง จะไม่ทำให้อุจหะไก่เป็นแผล จึงทำให้ผงพ่อแม่พันธุ์มีอัตราการผสมติดสูงขึ้น ไม่ทำให้เท้าไก่ตัวเมียสกปรกซึ่งจะช่วยทำให้รังไข่สะอาดไม่เป็นเปื้อนมูลที่ติดไปกับเท้าไก่ซึ่งก็จะได้ไขฟักสะอาดขึ้น ส่งผลให้อัตราการฟักออกดีขึ้น และคุณภาพของลูกไก่ดีขึ้น แต่การจัดการพื้นที่ปูทับด้วยวัสดุรองพื้นทั้งหมดให้มีคุณภาพดีนั้นทำได้ยากในทางปฏิบัติและมักจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าพื้นแบบกึ่งสแลท

พื้นกึ่งสแลท (Combination of slats and litter floor)

พื้นกึ่งสแลทนิยมใช้กันมากในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์因为จะทำให้อัตราการผสมติดต่ำกว่า ไข่บนพื้นมีน้อยกว่า และสามารถติดตั้งระบบระบายอากาศได้ดีกว่า ต้นทุนการเลี้ยงไก่ต่อโรงเรือนต่ำกว่า ไข่บนพื้นจะเป็นสแลทพลาสติกเนื่องจากการติดตั้งและการทำความสะอาดจะง่ายกว่าพื้นสแลทที่ทำจากไม้

รังไข่ (Nest)

รังไข่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากและมีผลอย่างมากต่อจำนวนไข่บนพื้นและคุณภาพของไข่ฟัก ไข่บนพื้นจะสกปรก ทำความสะอาดยากและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในตู้ฟักทำให้ไข่เน่า

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

มากขึ้น ปกติไก่บนพื้นจะมีอัตราการฟักออกต่ำ ลูกไก่ที่ฟักออกมาจะมีคุณภาพต่ำเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย นอกเหนือจากนี้ไบเบนพื้นจะถูกเหยียบจนไข่แตกได้ง่ายและจะส่งผลให้เกินผุงนั่น มีนิสัยจิกไข่ได้ดังนั้นเป้าหมายของการจัดการรังไข่คือ จะต้องทำให้มีไบเบนพื้นน้อยที่สุด และเปอร์เซ็นต์ไข่แตกหรือบุ่มไม่ควรจะเกิน 2% ในไก่อ่อนน้อย และไม่ควรเกิน 3% ในไก่ อายุมาก

เนื่องจากการผลิตไข่ฟักที่มีคุณภาพดีจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้เลี้ยงจึงต้องลงทุนสูงในการเลือกใช้รังไข่ที่มีคุณภาพดีและมีการจัดการอย่างเข้มงวด รังไข่ที่มีไข่ในปัจจุบันมีทั้งที่เป็นระบบเก็บไข่อัตโนมัติและเก็บด้วยมือของผู้เลี้ยงเอง และมีทั้งที่เป็นรังไข่เดียวและรังไข่รวม

รังไข่แต่ละแบบแต่ละลักษณะจะมีผลต่อการไข่ของไก่แตกต่างกัน โดยพบว่าแม่พันธุ์ไก่กระทะจะไวต่อรังไข่ที่มีรูปแบบไม่เหมาะสมและสถานที่วางรังไข่ไม่เหมาะสมมากกว่าแม่พันธุ์ไก่ไข่ นอกจากนี้รังไข่สำหรับแม่พันธุ์ไก่กระทะจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าแม่พันธุ์ไก่ไข่ด้วย

จำนวนรังไข่ที่ใช้จะต้องจัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอ โดยทั่วไปจะใช้ในอัตรารังไข่ 1 รังต่อแม่ไก่ 4-5 ตัว หรือรังไข่แบบรวมขนาดยาว 1 เมตรต่อแม่ไก่ 35-40 ตัว ถ้าเลี้ยงไข่ในสภาพอากาศร้อนก็ควรจะเพิ่มจำนวนรังไข่ให้มากขึ้น การติดตั้งรังไข่ควรจะติดตั้งไว้บนพื้นสแลทและมีคอนไม้สำหรับเกาะไว้ด้านหน้ารังไข่เพื่อให้แม่ไก่กระทะโดยเด็ดหัวไปเกาะก่อนที่จะเข้าไปวางไข่ในรังได้สะดวก นอกจากนี้คอนไม้สำหรับเกาะหน้ารังนี้ควรจะทำให้สามารถพับปิดหน้ารังได้เพื่อป้องกันมิให้ไก่เข้าไปนอนในรังไข่ในช่วงเวลากลางคืน

พื้นที่ให้อาหาร (Feeder space)

ความต้องการพื้นที่ให้อาหารสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ในระยะให้ไข่จะมากกว่าในระยะไก่รุ่น พื้นที่การให้อาหารสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์แสดงในตารางที่ 5 นอกจากจะต้องมีพื้นที่ให้อาหารอย่างเพียงพอแล้ว ควรจะกระจายอาหารให้ทั่วถึงทั้งโรงเรือนและไก่สามารถกินได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากเริ่มให้อาหาร ดังนั้นการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ในระบบอุตสาหกรรมจึงนิยมใช้ระบบการให้อาหารแบบอัตโนมัติ ระบบการขนส่งอาหารในท่อส่งอาหารมักจะใช้แบบเกลี่ยวสวน (Auger) หรือแบบสายพาน (Chain) ถ้าหากโรงเรือนมีความยาวมากอาจจำเป็นต้องมีถังพักอาหารหลาย ๆ ถังระหว่างทางเพื่อให้การกระจายอาหารทำได้เร็วขึ้น

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

ตารางที่ 5 แสดงพื้นที่การให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ (ทั้งตัวผู้และตัวเมีย)

| พันธุ์ | รงอาหาร ¹ | | จำนวนตัว/อุปกรณ์ | |
|----------------------|----------------------|-----------|------------------|--------------------------|
| | นิว | เซนติเมตร | Pan ² | Tube feeder ³ |
| ไก่เล็กขอร์นมาตราฐาน | 3.75 | 9.4 | 13 | 16 |
| ไก่ไข่เปลือกสีน้ำตาล | 4.25 | 10.6 | 11 | 13 |
| ไก่กระทงขนาดเล็ก | 5.00 | 12.5 | 10 | 12 |
| ไก่กระทงมาตรฐาน | 6.00 | 15.0 | 8 | 11 |

หมายเหตุ

¹ ความกว้างด้านเดียว² เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว (30 เซนติเมตร)³ เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว (41 เซนติเมตร)

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 638

การให้อาหารแยกเพศ (Sex-separate feeding)

การควบคุมน้ำหนักตัวของไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อไม่ให้ไก่มีน้ำหนักมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ตัวผู้ สามารถทำได้โดยการให้อาหารแบบแยกเพศ การให้อาหารอาหารแยกเพศจะทำให้ผู้เลี้ยงสามารถปรับระดับโภชนาในอาหารสำหรับไก่แต่ละเพศและสามารถควบคุมปริมาณอาหารที่กินของแต่ละเพศได้ วิธีการก็คือ ใช้ตะแกรง (Grill) ครอบ หรือใช้ห่อ (Tube) หรือใช้ลวด (Wire) ที่มีขนาดเพียงพอที่หัวไก่ตัวเมียจะลอดลงไปกินได้ปิดไว้ด้านบนของอุปกรณ์ให้อาหารไก่ตัวเมีย เนื่องจากไก่ตัวผู้จะมีหัวขนาดใหญ่กว่าไก่ตัวเมีย ดังนั้น ไก่ตัวผู้จึงไม่สามารถกินอาหารจากอุปกรณ์ให้อาหารของตัวเมียได้ ในขณะที่ อุปกรณ์ให้อาหารไก่ตัวผู้จะติดตั้งไว้สูงในระดับที่ไก่ตัวผู้ยังคงกินได้สะดวก เนื่องจากไก่ตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่า และตัวเตี้ยกว่า ดังนั้น ไก่ตัวเมียจึงไม่สามารถกินอาหารจากอุปกรณ์ให้อาหารไก่ตัวผู้ได้

อุปกรณ์ให้น้ำ (Waterers)

การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้น้ำให้เพียงพอและให้ไก่ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอตามความต้องการนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการจัดการน้ำดื่ม ถ้าหากไก่ได้รับน้ำไม่เพียงพอจะส่งผลให้ผลผลิตไปลดลง อัตราการผสมติดลดลง และอัตราการฟักออกลดลง โดยปกติไก่ตัวผู้และตัวเมียจะดื่มน้ำในปริมาณที่เท่ากัน ความต้องการน้ำดื่มจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายนอกเรือนเพิ่มขึ้น

การจัดการไก่ตัวผู้ให้มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง

ระบบสืบพันธุ์ไก่ตัวผู้ (Male reproduction)

เมื่อมีการผสมพันธุ์ไก่ตัวผู้จะขับหลังน้ำเชืออกอมาครั้งละประมาณ 0.1-1.0 มิลลิลิตร และไก่ตัวผู้สามารถผสมพันธุ์ได้วันละประมาณ 10-30 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการแข่งขันกับตัวผู้ตัวอื่น จำนวนตัวเมียที่ยอมให้ผสม ตำแหน่งในการจัดลำดับทางสังคม อุณหภูมิโรงเรือน ความเข้ม และความยาวแสง ฯลฯ ไก่ตัวผู้หนึ่งตัวอาจจะผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวเดิมวันละหลาย ๆ ครั้ง ไก่ตัวเมียที่ถูกตัวผู้ผสมพันธุ์มากที่สุดจะเป็นไก่ที่อยู่ในลำดับกลางทางสังคม ปกติไก่ตัวผู้ที่อยู่ในลำดับเป็นผู้นำทางสังคมเท่านั้นที่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์บ่อยที่สุด ไก่ที่เป็นตัวด้อยทางสังคมจะไม่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์เนื่องจากจะโดนไก่ตัวผู้ที่แข็งแรงกว่าขับไล่ออกไป

การจัดการไก่ตัวผู้นั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ไก่ทุกตัวมีโอกาสได้ผสมพันธุ์อย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถทำได้โดยการคัดໄปด้อยออกไปและมีการควบคุมน้ำหนักตัวโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของการให้ผลผลิตไป

นิสัยก้าวร้าวในไก่ตัวผู้ (Male aggressiveness)

เพื่อให้การผสมพันธุ์ประสบผลสำเร็จ ไก่ตัวผู้จึงควรมีนิสัยข่มตัวเมียหรืออยู่ในลำดับทางสังคมที่สูงกว่าตัวเมีย ในอดีต นิสัยก้าวร้าว ความกระตือรือร้นของไก่ตัวผู้ และนิสัยข่มตัวเมียจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าไก่ตัวผู้จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ แต่การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบัน ไก่หลายสายพันธุ์ ตัวผู้มักเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก่อนตัวเมีย ทำให้ไก่ตัวเมียพยายามหนีห่างจากตัวผู้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงแรกเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เท่านั้น วิธีการแก้ไขคือควรใช้ไก่ตัวผู้ในปริมาณน้อยในช่วงแรกหลังจากนั้นจึงค่อยเพิ่มจำนวนไก่ตัวผู้เข้าไปอีกเพื่อไก่ตัวเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

สัดส่วนตัวผู้และตัวเมีย (Ratio of male and female)

ในผู้ผสมพันธุ์ถ้าหากมีจำนวนไก่ตัวผู้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะส่งผลเสียต่ออัตราการผสมติด สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างตัวผู้และตัวเมียนั้นจะแตกต่างกันตามสายพันธุ์ ขนาดน้ำหนักตัว อุปนิสัยของไก่ และการจัดการภายในโรงเรือน ดังแสดงในตารางที่ 6 สัดส่วนของไก่ตัวผู้และตัวเมียมักจะบอกเป็นค่าจำนวนไก่ตัวผู้ต่อตัวเมีย 100 ตัว หรืออาจจะบอกเป็นค่าเบอร์เซ็นต์ก็ได้ ในทางปฏิบัติมักจะมีไก่ตัวผู้สำรองไว้มากกว่าที่แนะนำเพื่อเอาไว้ทดแทนในกรณีที่ถูกคัดทิ้งหรือตาย

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

ตารางที่ 6 แสดงสัดส่วนของไก่ตัวผู้ต่อตัวเมีย 100 ตัว สำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงและไก่ไข่ที่เลี้ยงบนพื้น 2 ลักษณะ

| ตัวผู้ | ตัวเมีย | ชนิดพ่อแม่พันธุ์ | วัสดุรองพื้น ทั้งหมด | พื้นกึ่งสแลท |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| เล็กหรือขนาดกลาง | เล็กหรือขนาดกลาง | ไก่ไข่สีขาว | 8 | 9 |
| ไก่ไข่สีน้ำตาล | ไก่ไข่สีน้ำตาล | ไก่ไข่สีน้ำตาล | 9 | 10 |
| ไก่กระทงมาตรฐาน | ไก่กระทงขนาดเล็ก | ไก่กระทง | 9 | 10 |
| ไก่กระทงมาตรฐาน | ไก่กระทงมาตรฐาน | ไก่กระทง | 9 | 10 |

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 640

น้ำหนักพ่อพันธุ์ (Male body weight)

การควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มีน้ำหนักมากหรือน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวมาตรฐานของสายพันธุ์ที่แนะนำโดยบริษัทผู้ผลิตสายพันธุ์ดังแสดงในตารางที่ 7 เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในระหว่างการให้ผลิต เนื่องจากการให้ผลิตไข่ และอัตราการผสมติด จะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่พ่อพันธุ์ ถ้าหากมีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะทำให้ตัวเมียไม่ยอมให้ผสมพันธุ์ ส่งผลให้อัตราการผสมติด และไข่มีเชื้อต่ำลง

ตารางที่ 7 แสดงน้ำหนักตัวมาตรฐานที่แนะนำสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ระหว่างการให้ผลิตไข่ (กรัม/ตัว)

| อายุ | พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง | | | พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ | | |
|------|----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-----|
| | สัปดาห์ | วัน | เมีย | ผู้ | เมีย | ผู้ |
| 20 | 140 | 2,200 | 3,000 | 1,350 | 1,550 | |
| 24 | 168 | 2,600 | 3,600 | 1,540 | 1,690 | |
| 30 | 210 | 3,200 | 4,200 | 1,610 | 1,800 | |
| 40 | 280 | 3,450 | 4,300 | 1,670 | 1,920 | |
| 50 | 350 | 3,550 | 4,400 | 1,700 | 1,990 | |
| 60 | 420 | 3,700 | 4,550 | 1,720 | 2,030 | |
| 64 | 448 | 3,750 | 4,650 | 1,740 | 2,070 | |

หมายเหตุ ซึ่งน้ำหนักก่อนให้อาหาร

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 642

การย้ายไก่ตัวผู้และตัวเมียเข้าโรงเรือนไก่ไข่

การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์

ในกรณีที่ใช้ระบบการเลี้ยงแบบให้อาหารแยกเพศควรจะนำไก่ตัวผู้เข้ามาในโรงเรือนก่อนตัวเมียประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ตัวผู้ได้มีเวลาปรับตัวให้เคยชินกับอุปกรณ์ให้อาหาร วิธีการนี้มีข้อควรระวังคือ ในช่วงแรกของการไข่ไก่ตัวผู้มักจะมีนิสัยข่มตัวเมียมากขึ้นซึ่งอาจทำให้ตัวเมียบางตัวถูกผสมพันธุ์มากเกินไป

การคัดไก่ตัวผู้ออก

ในระหว่างการให้ไข่ควรจะมีการดูแลไก่ตัวผู้อย่างใกล้ชิด ถ้าพบว่าไก่ตัวใดไม่สมบูรณ์ก็ควรจะคัดออกทันที เนื่องจากไก่ตัวผู้มักจะผสมพันธุ์กับไก่ตัวเมียเพียงไม่กี่ตัวที่ตนเองชอบเท่านั้น ซึ่งถ้าหากไก่ตัวผู้ตัวนั้นไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ก็จะทำให้ไก่ตัวเมียกลุ่มนั้นไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือแม้แต่ไก่ตัวอื่นก็จะไม่ยอมมาผสมพันธุ์ด้วยจนกว่าจะจับไก่ตัวผู้ที่เคยคุมตัวเมียกลุ่มนั้นออกนำไปเสียก่อน

การกระตุนให้ไก่ตัวผู้ออกกำลังกาย

ไก่ตัวผู้ควรจะมีการออกกำลังกายบ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาอ่อนแอ การกระตุนให้ไก่ตัวผู้ได้ออกกำลังกายสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การยกอุปกรณ์ให้อาหารสำหรับไก่ตัวผู้ให้สูงในระดับที่ไก่ต้องยืดตัวเล็กน้อยเพื่อจิกกินอาหาร หรือโดยการโรยเมล็ดธัญพืชลงบนพื้นในช่วงบ่ายเพื่อให้ไก่ได้ออกแรงคุ้ยเขี่ยก็จะช่วยให้ไก่ได้ออกกำลังขาได้ดี

ไก่ตัวผู้ขี้ลาด (Timid male)

ไก่ตัวผู้ที่อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูงทางสังคมจะมีโอกาสได้จับคู่ผสมพันธุ์กับตัวเมีย เนื่องจาก การจัดลำดับทางสังคมจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว ไก่ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมักจะเป็นตัวที่ด้อยทางสังคมหรือเรียกว่าไก่ขี้ลาด (Timid male) ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมน้ำหนักตัวให้ไก่ตัวผู้ทุกตัวมีน้ำหนักเป็นไปตามมาตรฐานที่แนะนำโดยบริษัทผู้ผลิต ถ้าหากมีไก่ตัวผู้มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานมาก ๆ ก็ควรเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ให้อาหารสำหรับไก่ตัวผู้ให้เพียงพอเพื่อให้ไก่ได้กินอาหารได้มากขึ้น

การใช้ไก่ตัวผู้ทดสอบระหว่างการให้ไข่ (Spiking)

ในระหว่างการผสมพันธุ์ของไก่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พันธุ์ไก่จะมีอัตราการผสมติดลดลงเรื่อย ๆ เมื่ออายุมากขึ้น ผู้เลี้ยงไก่บางรายจะใช้วิธีคัดไก่ตัวผู้บางตัวที่มีน้ำหนักมากหรืออนุอ่อนเกินไปออกหลังจากที่ไก่ให้ไข่ไปแล้วประมาณ 5-7 เดือน แล้วนำไก่ตัวผู้ที่หนุ่มกว่าเข้ามาทดแทนซึ่งจะทำให้อัตราการผสมติดเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาที่จะตามมาก็คือ จะทำให้ต้นทุนการผลิตไข่ฟักเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการติดโรคจากไก่ผุ่งอ่อนมากขึ้น ดังนั้น การจัดการที่ดีก็คือ การเลี้ยงและการจัดการให้ไก่ตัวผู้มีน้ำหนักตามมาตรฐาน และมีสุขภาพดีตลอดระยะเวลาให้การไข่

การผสมพันธุ์ไม่เพียงพอ

เนื่องจากไก่พ่อพันธุ์มีน้ำหนักตัวมากถ้าหากไก่ตัวเมียยืนอยู่บนพื้นสแลท และตัวผู้ขึ้นผสมพันธุ์ จะทำให้เห้าไก่ตัวเมียบาดเจ็บและเสียการทรงตัวได้ จึงทำให้ไก่ตัวเมียมักจะไม่ยอมให้ตัวผู้ขึ้นผสมพันธุ์ ในขณะที่ตนเองกำลังยืนอยู่บนพื้นสแลท ดังนั้น ถ้าเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์บนพื้นกิงสแลทจึงควรจะหาวิธีการ ที่จะให้ไก่ตัวเมียลงมาอยู่บนพื้นที่ปูด้วยวัสดุรองพื้นข้างล่างบ้าง เนื่องจากการผสมพันธุ์จะประสบ ความสำเร็จมากที่สุดบนพื้นที่ปูด้วยวัสดุรองพื้น การจัดการอาจจะทำได้โดยการรอยเม็ดรักพืชบนพื้น เพื่อดึงดูดให้ไก่ทุกตัวลงมาคุ้ยเขี่ยกินในช่วงบ่าย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไก่ตัวผู้ได้มีโอกาสผสมพันธุ์ กับตัวเมียมากขึ้น